




Жидкое комплексное микроудобрение

Простой способ  
повышения  
урожайности - использование  
возможностей микроэлементов!





Применяется в традиционных агротехнологиях для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки растений. Образует на поверхности растений наноструктуру, удерживающую воду и дополнительные источники питания растений.

Содержание элементов, не менее, г/л

| Cu  | Zn  | B   | Mg   | Co  | Fe | Mn   | Se   | Mo  | Si  | N       | P                                | K                  | S  |
|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|-----|---------|----------------------------------|--------------------|----|
|     |     |     |      |     |    |      |      |     |     | (общий) | (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | (K <sub>2</sub> O) |    |
| 2,5 | 5,7 | 1,7 | 14,8 | 0,1 | 3  | 11,4 | 0,01 | 0,2 | 9,3 | 35      | 12,9                             | 11,4               | 32 |

- ✓ Обеспечивает экономически-оправданную прибавку урожая всех с/х культур.
- ✓ Проявляет адаптогенное действие, повышая иммунитет растений к болезням, засухе, резким климатическим изменениям и другим стрессовым факторам.
- ✓ Оптимизирует природные процессы защиты, фотосинтеза и минерального питания растений.
- ✓ Позволяет снижать нормы внесения минеральных удобрений, усиливая биологическую активность действующих веществ.
- ✓ Совместное применение со средствами защиты растений повышает общую эффективность обработок.
- ✓ Обладает пролонгированным универсальным действием.



# Результаты испытаний комплексного микроудобрения «Грин Лифт»

(проведены ФГБУ ЦАС «Нижегородский» и ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ»)

| Культура                                                                     | Урожайность, ц/га |      | Прибавка |    | Примечания                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Контроль          | Опыт | ц/га     | %  |                                                                                |
| «День поля - 2012», Работкинский аграрный колледж, Нижегородская обл.        |                   |      |          |    |                                                                                |
| Яровая пшеница – сорт «Экада-70»                                             | 21,5              | 25,7 | 4,2      | 24 | прибавка клейковины – 2 %                                                      |
| ГУСП совхоз Алексеевский, Республика Башкортостан, 2012 г.                   |                   |      |          |    |                                                                                |
| Ранний картофель – сорт «Ред Скарлетт»                                       | 44,6              | 51,2 | 6,6      | 14 | увеличение товарности на 2,5%                                                  |
| Картофель – сорт «Мелодия»                                                   | 50,1              | 61   | 10,9     | 22 | увеличение товарности на 2,5%,<br>развитие альтернариоза<br>уменьшилось на 15% |
| ООО «Агропредприятие Княгининское», Нижегородская обл., 2010 г.              |                   |      |          |    |                                                                                |
| Ячмень                                                                       | 15                | 18   | 3        | 20 |                                                                                |
| ООО «Агропредприятие Соловьевское», Нижегородская обл., 2008 - 2009 гг.      |                   |      |          |    |                                                                                |
| Ячмень – сорт «Совет»                                                        | 19,2              | 24   | 4,8      | 25 |                                                                                |
| Опытно-производственное хозяйство «Центральное», Нижегородская обл., 2009 г. |                   |      |          |    |                                                                                |
| Яровая пшеница – сорт «Московская – 35»                                      | 41,2              | 48,6 | 7,4      | 18 | прибавка клейковины – 2 %                                                      |
| СООО СХП «Россия», Нижегородская обл., 2009 г.                               |                   |      |          |    |                                                                                |
| Озимая пшеница – сорт «Московская - 39»                                      | 13,1              | 17,4 | 4,3      | 33 |                                                                                |
| ОАО «Лакша», Нижегородская обл., 2008 г.                                     |                   |      |          |    |                                                                                |
| Яровая пшеница – сорт «Курская-2038»                                         | 19,7              | 24,9 | 5,2      | 26 |                                                                                |
| ОАО «Шатковская сельхозхимия», Нижегородская обл., 2008 г.                   |                   |      |          |    |                                                                                |
| Яровая пшеница – сорт «Тулайковская-10»                                      | 16                | 20,5 | 4,5      | 28 |                                                                                |

ООО «Бисолби Поволжье», 603098, Нижний Новгород, ул. Артельная, 29, оф. 318  
Звоните! Тел./факс: (831) 433-65-31, 463-65-33, e-mail: info@bio-fungicides.com



# Рекомендации по применению комплексного микроудобрения «Грин Лифт»

| Сельскохозяйственная культура     | Норма расхода препарата                                                           |             |                          |             | Фенофазы развития культур                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | семена, л/т                                                                       |             | вегетативная масса, л/га |             |                                                                                                                                                                          |
|                                   | Препарат                                                                          | Рабочий р-р | Препарат                 | Рабочий р-р |                                                                                                                                                                          |
| Зерновые озимые и яровые культуры | 1                                                                                 | 10          |                          |             | Обработка семян, можно одновременно с протравителем                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. Фаза кущения*<br>2. Трубкование-колошение**<br>3. Молочная спелость                                                                                                   |
| Зернобобовые (горох, вика и др.)  | 1                                                                                 | 10-30       |                          |             | Обработка семян, можно одновременно с протравителем                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. В фазу 3-4 листьев*<br>2. Бутонизация, перед цветением                                                                                                                |
| Подсолнечник                      | 1                                                                                 | 20-30       |                          |             | Обработка семян, можно одновременно с протравителем                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. В фазу 2-3 пар настоящих листьев*<br>2. В фазу 4-5 пар настоящих листьев (формирование корзинок)<br>3. До высоты растений 60 см и более поздние фазы (кроме цветения) |
| Картофель                         | 1                                                                                 | 20-40       |                          |             | Обработка посадочного материала                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. В фазу бутонизации*<br>2. После цветения**                                                                                                                            |
| Сахарная, кормовая свекла         | 1                                                                                 | 10          |                          |             | Обработка семян, можно одновременно с протравителем                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. 2-3 пары настоящих листьев<br>2. До смыкания рядков**<br>3. В период формирования корнеплодов                                                                         |
| Рапс                              | 1                                                                                 | 10          |                          |             | Обработка семян, можно одновременно с протравителем                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. В фазу розетки 3-5 листьев*<br>В фазу бутонизации (цветения)**                                                                                                        |
| Рис                               | 1                                                                                 | 10          |                          |             | Обработка семян, можно одновременно с протравителем                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                   |             | 1-2                      | 200-400     | 1. В фазе кущения - начала выхода в трубку*<br>2. В фазе цветения - начала молочной спелости**                                                                           |
| Все культуры, Корневая подкормка  | Доза применения                                                                   |             |                          |             |                                                                                                                                                                          |
|                                   | 1-2 л/га, концентрация рабочего раствора 0,01-0,02%, расход воды 10000-25000 л/га |             |                          |             | Корневая подкормка проводится через различные системы полива 1-3 раза в течение сезона с интервалом 10-15 дней                                                           |

\* можно совместить с обработкой гербицидами

\*\* при стрессовых условиях (засуха, резкие похолодания) желательно провести дополнительные обработки